

Liste I PIH SPE 100% Call ASMR III

INDICATIONS

CANCER DE LA PROSTATE

- Cancer résistant à la castration, non métastatique, avec un risque élevé de développer une maladie métastatique
- Cancer métastatique hormonosensible en association avec un traitement par suppression androgénique

POSOLOGIE

240 mg (4cp) une fois/jour

Utilisé en association dans certains cas

Chez les patients n'ayant pas subi de castration chirurgicale, il est nécessaire de maintenir la prise d'analogue de la GnRH (hormone de libération des gonadotrophines) qui a pour but de réaliser une castration médicale.

Modifications de posologie : si effets indésirables importants (toxicité de grade ≥ 3 ou effet indésirable intolérable) : suspension provisoire jusqu'à amélioration des symptômes (à un grade \leq ou au grade d'origine) puis, reprise à la même dose ou à une dose réduite (180 mg ou 120 mg), si nécessaire.

CONTRE-INDICATION

Hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients.

PRÉCAUTIONS ET SURVEILLANCE

Insuffisance rénale sévère

- Prudence

Insuffisance hépatique sévère

- Erléada® non recommandé

Risque de convulsions

- Erléada® non recommandé si antécédents de convulsions ou autres facteurs de prédisposition aux convulsions.

Risque de chutes et de fractures

- Risque à évaluer, prescription d'agents protecteurs des os si besoin.

Surveillance cardiaque


- Prise en charge des facteurs de risque : HTA, diabète, dyslipidémies.

Risque d'allongement du QT

MÉCANISME D'ACTION

ANTI ANDROGÈNE POUR LE CANCER DE LA PROSTATE

Inhibiteur sélectif du récepteur aux androgènes



EFFETS INDÉSIRABLES

Les plus fréquents :

Fatigue • Diarrhée • Eruption cutanée • Hypertension • Bouffées de chaleur • Risque de chute (fractures) • Arthralgies • Perte de poids • Hypothyroïdie

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

Apalutamide = Inducteur enzymatique puissant et de transporteurs

= métabolisé par les CYP2C8 et CYP3A4

► **Vigilance si association avec :** warfarine, acénocoumarol, darunavir, félodipine, midazolam, simvastatine, diazépam, oméprozole, phénytoïne...

► **Vigilance avec médicaments torsadogènes ou interférant sur le QT :** antiarythmiques, méthadone, moxifloxacine, antipsychotiques.



POURQUOI M'A-T-ON PRESCRIT CE MÉDICAMENT ? COMMENT AGIT-IL ?

Ce médicament vous a été prescrit pour traiter votre affection prostatique. Il empêche les hormones mâles comme la testostérone d'agir au niveau de la prostate. Les androgènes peuvent favoriser parfois la croissance du cancer. En bloquant les androgènes, l'apalutamide empêche les cellules cancéreuses de la prostate de développer.



COMMENT CONSERVER MON MÉDICAMENT ?

Conservez ce médicament dans son emballage d'origine, à température ambiante, à l'abri de l'humidité et hors de la vue et de la portée des enfants.



COMMENT DOIS-JE LE PRENDRE ?

Le traitement consiste en la prise quotidienne de 4 comprimés de 60 mg en une seule prise. Avalez les comprimés entiers, pendant ou en dehors des repas. N'arrêtez jamais votre traitement et ne modifiez jamais la dose prescrite par vous-même. Pensez bien à prendre les autres médicaments aussi.



QUE DOIS-JE FAIRE EN CAS D'OUBLI ?

S'il vous arrive d'oublier de prendre une dose, prenez-la dès que possible le jour même et poursuivez normalement votre traitement le lendemain. Ne prenez surtout pas de comprimés supplémentaires lors d'une même prise pour compenser la dose oubliée. Si vous oubliez de prendre votre médicament pendant plus d'une journée, il est préférable d'en parler à votre médecin.



À QUELS EFFETS INDÉSIRABLES DOIS-JE M'ATTENDRE ?

Signalez rapidement à votre pharmacien ou médecin tout problème cutané, tout mal de tête qui pourrait être dû à une augmentation de votre tension artérielle...



COMMENT DOIS-JE SURVEILLER LE TRAITEMENT ?

N'oubliez pas vos rendez-vous au laboratoire d'analyses médicales. Ce bilan est important pour un bon suivi de votre maladie et de votre traitement.



PUIS-JE PRENDRE D'AUTRES MÉDICAMENTS ?

Eviter l'automédication pendant votre traitement, demandez toujours conseil à un professionnel de santé avant de prendre un médicament ou des plantes (tisanes, gélules...) quels qu'ils soient, il peut exister un risque d'interaction.



EST-IL POSSIBLE DE CONDUIRE MA VOITURE ?

Ce médicament ne devrait pas avoir d'effet sur votre capacité à conduire des véhicules ou à utiliser des outils ou des machines. Toutefois, si vous avez des antécédents connus d'épilepsie, ou si vous avez un risque accru de convulsions, soyez prudent et demandez l'avis de votre médecin.



QU'EST-CE QUI POURRAIT ÊTRE UTILE AUSSI ?

Buvez suffisamment d'eau au cours de la journée, cela favorise une hydratation optimale de votre organisme et permet d'améliorer le fonctionnement de vos reins. Evitez l'exposition prolongée au soleil. Protégez-vous en cas d'exposition solaire.



ET AU NIVEAU DE LA SEXUALITÉ ?

Si vous avez des rapports sexuels avec une femme en âge de procréer, utilisez un préservatif. Veillez à ce que cette femme utilise une autre méthode de contraception hautement efficace pendant le traitement et pendant les 3 mois qui suivent votre dernière prise d'Erleada®. D'une manière générale lors de tout rapport sexuel, quel que soit la ou le partenaire, utilisez un préservatif.