

Liste I

PH

SPE

100%

Coll

ASMR V

INDICATIONS

CANCER DU POUMON

En monothérapie, chez l'adulte atteint d'un **cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) ALK positif avancé** dont la maladie a progressé après traitement par d'autres inhibiteurs de tyrosine kinases.

POSOLOGIE

Dose recommandée : 100 mg 1 fois/jour

Environ à la même heure, au cours ou en dehors des repas

Durée du traitement


Jusqu'à progression de la maladie ou survenue de toxicité inacceptable.

Réduction de posologie : 75 mg 1 fois/jour, puis 50 mg 1 fois/jour) en fonction de la tolérance.

Interruption définitivement du traitement : patient incapable de tolérer 50 mg 1 fois/jour.

MÉCANISME D'ACTION

Inhibiteur de protéine kinase



CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité au lorlatinib ou à l'un des excipients.
Inducteurs puissants du CYP3A4/5.

PRÉCAUTIONS ET SURVEILLANCE

Risque d'hyperlipidémie

Surveillance cholestérolémie-triglycéridémie avant traitement, 2, 4 et 8 semaines après instauration, puis à intervalles réguliers.

Traitement hypolipémiant si nécessaire.

Risque de troubles du système nerveux central

Si changements des fonctions cognitives, de l'humeur ou de l'élocution : baisse de posologie.

Risque de troubles cardiaques

Surveillance fonction cardiaque.

Risque de pancréatite

Dosages réguliers lipase et amylase.

Risque pulmonaire

Si dyspnée, toux, fièvre : examen médical du patient.

EFFETS INDÉSIRABLES

Les plus fréquents

Hypercholestérolémie, hypertriglycéridémie, œdème, neuropathie périphérique, effets cognitifs, fatigue, prise de poids, arthralgie, troubles de l'humeur, diarrhée.

INTÉRACTIONS MÉDICAMENTEUSES

- CI avec inducteurs puissants du CYP3A4/5.
- Produits à base de jus de pamplemousse.
- Très nombreuses autres interactions médicamenteuses : cf RCP.



POURQUOI M'A-T-ON PRESCRIT CE MÉDICAMENT ? ET COMMENT AGIT-IL ? ?

Ce médicament vous a été prescrit pour traiter votre affection au niveau de vos poumons.

Il agit en inhibant des enzymes que l'on appelle tyrosine kinase. L'inhibition de ces enzymes empêche la prolifération des cellules malignes et permet donc de traiter votre affection.



COMMENT CONSERVER MON MÉDICAMENT ?

Conservez ce médicament dans son emballage d'origine, à température ambiante, à l'abri de l'humidité et hors de la vue et de la portée des enfants.



COMMENT DOIS-JE LE PRENDRE ?

Le traitement consiste en la prise de 100 mg 1 fois/jour pendant ou en dehors des repas, à heure fixe. Les comprimés sont avalés en entier (ne pas les mâcher, broyer ou couper en deux avant de les avaler).

Des diminutions de posologies sont parfois nécessaires si votre médecin le juge nécessaire, par exemple en cas de survenue d'effets indésirables.

Faites bien votre traitement comme il vous l'a été prescrit, sans oublier. Ne l'arrêtez jamais et ne modifiez jamais la dose prescrite sans avis du médecin prescripteur. N'oubliez pas de prendre les autres médicaments qui vous ont éventuellement été prescrits.



QUE DOIS-JE FAIRE EN CAS D'OUBLI ?

S'il vous arrive d'oublier de prendre une dose, prenez-la dès que vous vous apercevez de l'oubli, sauf s'il reste moins de 4 heures avant la prise de la dose suivante ; dans ce cas, vous ne devez pas prendre la dose oubliée, attendez la prise suivante. Surtout, ne prenez pas 2 doses en même temps pour compenser une dose oubliée. Pensez aussi à noter tout oubli dans votre carnet de suivi.



A QUELS EFFETS INDÉSIRABLES DOIS-JE M'ATTENDRE ?

Si des effets indésirables surviennent pendant votre traitement, il est important de venir en parler à la pharmacie ou de contacter votre médecin. Signalez par exemple rapidement à votre médecin tout problème suivant : toux, fièvre, éruption cutanée, trouble de mémoire, trouble de l'humeur, difficultés à parler, difficultés à respirer, prise de poids rapide et tout effet indésirable persistant ou s'aggravant.



COMMENT DOIS-JE SURVEILLER LE TRAITEMENT ?

Si un bilan sanguin vous est régulièrement demandé, pensez bien à vos rendez-vous au laboratoire d'analyses médicales.



PUIS-JE PRENDRE D'AUTRES MÉDICAMENTS ?

Évitez l'automédication pendant votre traitement, demandez toujours conseil à un professionnel de santé avant de prendre un médicament quel qu'il soit, il peut exister un risque d'interaction médicamenteuse.



EST-IL POSSIBLE DE CONDUIRE MA VOITURE ?

Soyez prudent lors de la conduite de véhicules ou de l'utilisation de machines car ce médicament peut générer des troubles du système nerveux.



QU'EST CE QUI POURRAIT ÊTRE UTILE AUSSI ?

Buvez suffisamment d'eau au cours de la journée, cela est bon pour une hydratation optimale de votre organisme et permet d'améliorer le fonctionnement de vos reins. Évitez l'exposition prolongée au soleil.

Ne prenez pas de pamplemousse ou de jus de pamplemousse car ils peuvent augmenter les concentrations de votre médicament dans votre organisme. Faites attention si vous prenez des tisanes ou des préparations de phytothérapie pour lesquelles des interactions pourraient être inconnues.

Ce médicament contient du lactose comme excipient. Si vous avez une intolérance au galactose, un déficit total en lactase ou un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose (maladies héréditaires rares) vous ne devez pas prendre ce médicament.



ET AU NIVEAU DE LA SEXUALITÉ ?

Une contraception efficace est nécessaire pendant toute la durée du traitement et pendant 35 jours après avoir reçu la dernière dose de Lorviqua®.

Les patients de sexe masculin sous traitement de Lorviqua® et dont la partenaire est en âge de procréer ou enceinte, doivent utiliser des préservatifs, jusqu'à au moins 14 semaines après l'administration de la dernière dose de Lorviqua®.