

# ANTIVIRAL CONTRE LE CYTOMÉGALOVIRUS

PREVYMIS® - letermovir  
Laboratoire MSD France

Comprimés pelliculés à 240 mg et à 480 mg  
(boîtes de 28)

Liste I

PH

65 %

Coll

ASMR IV

## INDICATIONS

### PROPHYLAXIE CONTRE LE CYTOMÉGALOVIRUS

Prophylaxie de la réactivation du cytomegalovirus (CMV) et de la maladie à CMV chez les adultes séropositifs au CMV receveurs [R+] d'une greffe allogénique de cellules souches hématopoïétiques (GCSH).

## POSOLOGIE

1 comp à 480 mg 1 fois/j avalé entier, avec ou sans nourriture.  
240 mg/j si co-administration avec ciclosporine.


#### Traitement débuté :

- le jour de la greffe, et au plus tard 28 jours post-greffe ;
- avant ou après la prise de la greffe.

**Traitement poursuivi** jusqu'à 100 jours post-greffe.

## MÉCANISME D'ACTION

### ANTIVIRAL SYSTÉMIQUE À ACTION DIRECTE



## CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité au letermovir ou à l'un des excipients.  
Certains médicaments (cf rubrique interactions).

## PRÉCAUTIONS ET SURVEILLANCE

- **Attention au risque d'effets indésirables ou d'effet thérapeutique diminué en raison d'interactions médicamenteuses**

L'utilisation concomitante de Prevymis® avec certains médicaments peut donner lieu à des interactions médicamenteuses dont certaines peuvent entraîner :

- **de possibles effets indésirables** cliniquement significatifs liés à une exposition accrue aux traitements concomitants ou au letermovir ;
- **une diminution significative des concentrations plasmatiques du traitement concomitant**, et entraîner un effet thérapeutique moindre de ce traitement.

- **Présence de lactose.**

## EFFETS INDÉSIRABLES

**Les plus fréquents : diarrhée, nausées, vomissements.**

**Autres effets peu fréquents :** hypersensibilité, diminution de l'appétit, dysgueusie, céphalées, vertiges, douleur abdominale, élévation de l'alanine aminotransférase (ALAT), élévation de l'aspartate aminotransférase (ASAT), spasmes musculaires, élévation de la créatinine sanguine, fatigue, œdème périphérique.

## INTÉRACTIONS MÉDICAMENTEUSES

- **Contre-indications** avec le pimozide, les alcaloïdes de l'ergot de seigle, le millepertuis (*Hypericum perforatum*).
- **Lorsque le letermovir est associé à la ciclosporine :** l'utilisation concomitante de dabigatran, d'atorvastatine, de simvastatine ou de rosuvastatine est contre-indiquée.

Compte tenu du nombre important de multiples autres interactions, il est nécessaire de consulter le RCP pour une liste exhaustive.

# ANTIVIRAL CONTRE LE CYTOMÉGALOVIRUS

PREVYMIS® - letermovir  
Laboratoire MSD France

Comprimés pelliculés à 240 mg et à 480 mg  
(boîtes de 28)



## POURQUOI M'A-T-ON PRESCRIT CE MÉDICAMENT ? ET COMMENT AGIT-IL ?

Ce médicament vous a été prescrit parce que vous avez récemment reçu une greffe de moelle osseuse. Il vous aide à ne pas développer une infection virale à cytomégalo virus ou CMV. Le CMV est un virus que beaucoup de personnes ont, sans le savoir. Normalement, le CMV reste silencieux dans l'organisme, cependant, si votre système immunitaire est affaibli après avoir reçu une greffe, le virus peut se réactiver. **Ce principe actif, est un nouvel antiviral** qui agit directement sur le virus en l'empêchant de se multiplier.



## COMMENT CONSERVER MON MÉDICAMENT ?

Conservez ce médicament dans son emballage d'origine, à température ambiante, à l'abri de l'humidité et hors de la vue et de la portée des enfants.



## COMMENT DOIS-JE LE PRENDRE ?

Prenez 1 comprimé par jour, à la même heure, avalé entier, avec ou sans nourriture. Le comprimé ne doit pas être divisé, écrasé ou croqué. Si vous prenez également de la ciclosporine, votre médecin réduira la dose de Prevymis® à 240 mg une fois par jour. N'arrêtez pas de prendre Prevymis® sans en parler à votre médecin au préalable. N'oubliez pas votre traitement chaque jour, cela évitera de tomber malade à cause du CMV après votre greffe de moelle osseuse.



## QUE DOIS-JE FAIRE EN CAS D'OUBLI ?

Si vous oubliez de prendre une dose, prenez-la aussitôt que vous vous en rappelez. Si vous vous en apercevez qu'au moment de prendre la dose suivante, la dose oubliée ne doit pas être prise et vous devez reprendre le schéma d'administration habituel. Ne prenez pas une double dose.



## À QUELS EFFETS INDÉSIRABLES DOIS-JE M'ATTENDRE ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde. **Si des effets indésirables surviennent pendant votre traitement**, il est important de venir en parler à la pharmacie ou de contacter votre médecin. A titre d'exemple, les effets indésirables les plus fréquemment rapportés sont des troubles digestifs type nausées, diarrhées et vomissements.



## COMMENT DOIS-JE SURVEILLER LE TRAITEMENT ?

Un suivi régulier est réalisé par votre médecin. Vous aurez probablement des bilans à effectuer au laboratoire d'analyses médicales selon le rythme qu'il vous précisera. Pensez bien à vos rendez-vous.



## PUIS-JE PRENDRE D'AUTRES MÉDICAMENTS ?

Il est important d'informer votre médecin que vous êtes traité par Prevymis® avant de prendre un autre médicament. En effet, Prevymis® peut altérer l'action d'autres médicaments et, d'autres médicaments peuvent aussi altérer l'effet de Prevymis®. **Évitez l'automédication** pendant votre traitement, demandez toujours conseil à un professionnel de santé avant de prendre un médicament quel qu'il soit, en raison de ce risque d'interaction médicamenteuse.



## EST-IL POSSIBLE DE CONDUIRE MA VOITURE ?

Prevymis® peut avoir une influence mineure sur l'aptitude à conduire ou à utiliser des machines. Une fatigue et des vertiges ont été rapportés chez certains patients pendant le traitement, pouvant avoir une influence sur l'aptitude du patient à conduire et à utiliser des machines.



## QU'EST-CE QUI POURRAIT ÊTRE UTILE AUSSI ?

**Buvez suffisamment d'eau** au cours de la journée, cela est bon pour une hydratation optimale de votre organisme. Cela permet aussi d'améliorer le fonctionnement de vos reins. **Prevymis® contient du lactose**, si vous savez que vous avez une intolérance à certains sucres, parlez-en à votre médecin avant de prendre ce médicament.



## ET AU NIVEAU DE LA GROSSESSE ?

Prevymis® n'est pas recommandé pendant la grossesse ni chez la femme en âge de procréer n'utilisant pas de contraception.