

Liste I

15 %

Coll

ASMR V

INDICATIONS

VESSIE DOULOUREUSE

Syndrome de la vessie douloureuse caractérisé par des glomérulations ou bien des ulcères de Hunner chez les adultes souffrant de douleurs modérées à importantes, d'impériosité urinaire et de pollakiurie.

POSOLOGIE

300 mg/j en trois prises d'une gélule de 100 mg.

Réponse au traitement **réévaluée tous les 6 mois**.
Si aucune amélioration après 6 mois, le traitement doit être arrêté.

Traitement poursuivi de façon chronique tant que la réponse est maintenue.

CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité au principe actif ou à l'un des excipients
Patients qui saignent (faible effet anticoagulant du principe actif).

Les menstruations ne sont pas une contre-indication.

PRÉCAUTIONS ET SURVEILLANCE

■ Risque hémorragique

Prudence dans certains cas : *interventions invasives, coagulopathies, prise de médicaments perturbant la coagulation, antécédents de thrombocytopénie induite par l'héparine ou par le polysulfate de pentosan sodique.*

■ Insuffisances hépatique ou rénale


Surveillance étroite.

■ Risque oculaire

Examen ophtalmologique après 6 mois de traitement, puis tous les ans en cas de symptômes ou tous les 5 ans pour les autres.
Risque rare de maculopathie pigmentaire (*difficultés lors de la lecture, distorsions visuelles, vision altérée des couleurs et/ou adaptation lente à une luminosité faible ou réduite*).

MÉCANISME D'ACTION

EFFET LOCAL PROTECTEUR DE LA MUQUEUSE



EFFETS INDÉSIRABLES

Les plus fréquents : maux de tête, étourdissements, manifestations gastro-intestinales (diarrhée, nausée, douleur abdominale et saignement rectal).

Autres effets possibles peu fréquents : infections, troubles hématologiques, photosensibilité, allergie, perte ou gain de poids, anorexie, labilité émotionnelle, dépression, insomnie, dyspnée, éruptions cutanées, myalgies, arthralgies, pollakiurie, asthénie, douleur pelvienne...

Consultez le RCP pour une liste exhaustive

INTÉRACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Faible effet anticoagulant du polysulfate de pentosan sodique :

→ les patients recevant un traitement concomitant par anticoagulants, dérivés de l'héparine, agents thrombolytiques ou antiplaquettaires, y compris acide acétylsalicylique, ou anti-inflammatoires non stéroïdiens **doivent être évalués pour le risque hémorragique afin d'adapter la dose si nécessaire.**



POURQUOI M'A-T-ON PRESCRIT CE MÉDICAMENT ?

Ce médicament vous a été prescrit pour traiter vos troubles de la vessie. Il contient la substance active polysulfate de pentosan sodique. Une fois le médicament administré par voie orale, il passe dans l'urine et se fixe à la paroi de la vessie, contribuant ainsi à former une couche protectrice, ce qui permet de traiter les lésions vésicales.



COMMENT CONSERVER MON MÉDICAMENT ?

Conservez ce médicament dans son emballage d'origine, à température ambiante, à l'abri de l'humidité et hors de la vue et de la portée des enfants.



COMMENT DOIS-JE LE PRENDRE ?

La dose recommandée est de 1 gélule trois fois par jour. Prenez vos gélules avec de l'eau au moins 1 heure avant ou 2 heures après les repas.



QUE DOIS-JE FAIRE EN CAS D'OUBLI ?

Ne prenez pas de dose double pour compenser la gélule que vous avez oublié de prendre. Continuez votre traitement comme vous avez l'habitude.



À QUELS EFFETS INDÉSIRABLES DOIS-JE M'ATTENDRE ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Si des effets indésirables surviennent pendant votre traitement, il est important de venir en parler à la pharmacie ou de contacter votre médecin.

A titre d'exemple, les événements indésirables les plus fréquents sont principalement des maux de tête, des étourdissements et des manifestations gastro-intestinales telles que diarrhée, nausée, douleur abdominale et saignement rectal. D'autres effets moins fréquents peuvent aussi survenir.



COMMENT DOIS-JE SURVEILLER LE TRAITEMENT ?

Un suivi ophtalmologique est réalisé après 6 mois de traitement puis régulièrement pour vérifier qu'il n'y ait pas d'atteinte au niveau de votre rétine. En effet de rares cas d'atteinte de la macula ont été rapportés.

Contactez immédiatement votre médecin si vous ressentez des changements visuels comme par exemple des difficultés lors de la lecture, des distorsions visuelles, une vision altérée des couleurs et/ou une adaptation plus lente à une luminosité faible ou réduite.



PUIS-JE PRENDRE D'AUTRES MÉDICAMENTS ?

Il est important que vous précisiez à tout médecin que vous consultez que vous êtes traité par Elmiron®.

Évitez l'automédication pendant votre traitement, demandez toujours conseil à un professionnel de santé avant de prendre un médicament quel qu'il soit, en raison de ce risque d'interaction médicamenteuse. Il existe des interactions possibles avec des médicaments qui empêchent la coagulation sanguine, c'est-à-dire les anticoagulants, ou des médicaments contre la douleur qui réduisent la coagulation sanguine comme les anti-inflammatoires.



EST-IL POSSIBLE DE CONDUIRE MA VOITURE ?

Elmiron® n'a aucun effet sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines.



QU'EST-CE QUI POURRAIT ÊTRE UTILE AUSSI ?

Buvez suffisamment d'eau au cours de la journée, cela est bon pour une hydratation optimale de votre organisme. Cela permet aussi d'améliorer le fonctionnement de vos reins.

Évitez de vous exposer au soleil sans protection.



ET AU NIVEAU DE LA GROSSESSE ?

Elmiron® n'est pas recommandé pendant la grossesse.