

# ANTIÉPILEPTIQUE

BRIVIACT® - brivaracétam  
Laboratoire UCB Pharma

Comprimés pelliculés à 10 mg (boîte de 14)  
et à 25, 50, 75 et 100 mg (boîtes de 56)  
Solution buvable à 10 mg/mL (flacon de 300 mL)

Liste I

65 %

Coll

ASMR V

## INDICATIONS

### ÉPILEPSIE

En **association**, dans le traitement des **crises partielles** avec ou sans généralisation secondaire chez les **adultes, les adolescents et les enfants à partir de 4 ans**

## POSOLOGIE

#### Adulte :

Dose initiale **50 ou 100 mg/j** (en 2 prises)  
Puis, en fonction de réponse/tolérance : dose ajustée pour le traitement d'entretien entre 50 et 200 mg/j.

#### Enfants à partir de 4 ans

Dose initiale **50 mg/j** (en 2 prises), 100 mg dans certains cas. Puis dose adaptée en fonction du poids corporel.

## CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité au brivaracétam  
ou à l'un des excipients.

## PRÉCAUTIONS ET SURVEILLANCE

#### Risque d'idées et de comportement suicidaire

Surveillance du patient, traitement approprié si nécessaire.


Consultation d'un médecin en cas de signes évocateurs (idées suicidaires, mal être, anxiété, dépression...)

#### Risque liés aux excipients

- Présence de **lactose** (comprimés) : risque d'intolérance.
- Présence de **sorbitol** (solution buvable) : risque d'intolérance.
- Présence de **parahydroxybenzoate de méthyle** (solution buvable) : risque de réactions allergiques éventuellement retardées.

## MÉCANISME D'ACTION

### MODULATION DE L'EXOCYTOSE DES NEUROTRANSMETTEUR



## EFFETS INDÉSIRABLES

#### Les plus fréquents (dose-dépendants) :

somnolence, sensations vertigineuses.

**Autres effets fréquents :** diminution appétit, dépression, anxiété, insomnie, irritabilité, convulsions, infections des voies respiratoires supérieures, toux, nausées, vomissements, constipation, fatigue.

**Effets peu fréquents :** neutropénie, hypersensibilité, idées suicidaires, trouble psychotique, agressivité, agitation.

#### Même profil chez l'enfant.

Idées suicidaires/troubles comportement plus fréquents chez l'adolescent.

Effet additionnel hyperactivité psychomotrice.

## INTÉRACTIONS MEDICAMENTEUSES

#### Interactions moins importantes qu'avec d'autres antiépileptiques

- **Rifampicine** : ajustement de la dose de brivaracétam.
- **Millepertuis** : prudence lors de son introduction ou son arrêt.
- **Autres antiépileptiques inducteurs enzymatiques** (carbamazépine, phénobarbital, phénytoïne) : aucun ajustement de la posologie n'est nécessaire.
- **Prise d'alcool** non recommandée.

Pour une liste exhaustive, se référer au RCP



## POURQUOI M'A-T-ON PRESCRIT CE MÉDICAMENT ?

Ce médicament appartient à la classe des antiépileptiques. Il vous a été prescrit pour traiter une épilepsie afin de vous éviter la survenue de crises épileptiques. Brivact® régularise la communication entre les cellules nerveuses, communication perturbée dans l'épilepsie.



## COMMENT CONSERVER MON MÉDICAMENT ?

Conservez ce médicament dans son emballage d'origine, à température ambiante, à l'abri de l'humidité et hors de la vue et de la portée des enfants.



## COMMENT DOIS-JE LE PRENDRE ?

La dose qui vous a été prescrite par votre médecin doit être administrée en **deux prises égales**, une le matin et une le soir. N'oubliez pas de prendre aussi les autres médicaments antiépileptiques qui vous ont été prescrits. Les comprimés pelliculés doivent être avalés entiers avec une boisson, et peuvent être pris avec ou sans nourriture. La solution buvable peut être diluée dans l'eau ou dans du jus de fruit peu de temps avant d'être avalée et peut être prise avec ou sans nourriture. **Ce traitement se prend au long cours**, continuez à bien prendre Brivact® jusqu'à ce que votre médecin vous dise d'arrêter. **N'arrêtez jamais votre traitement** de vous-même, sans l'avis du médecin.



## QUE DOIS-JE FAIRE EN CAS D'OUBLI ?

Si vous oubliez de prendre une ou plusieurs doses, vous prendrez une seule dose dès que possible et ensuite, vous prendrez la dose suivante à l'heure habituelle le matin ou le soir.



## À QUELS EFFETS INDÉSIRABLES DOIS-JE M'ATTENDRE ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde. **Si des effets indésirables surviennent pendant votre traitement**, il est important de venir en parler à la pharmacie ou de contacter votre médecin. A titre d'exemple, les effets indésirables les plus fréquemment rapportés sont des sensations de somnolence et des vertiges.



## COMMENT DOIS-JE SURVEILLER LE TRAITEMENT ?

Un suivi régulier par votre médecin de votre épilepsie et de votre traitement est réalisé pour vérifier l'efficacité et la bonne tolérance de ce médicament.



## PUIS-JE PRENDRE D'AUTRES MÉDICAMENTS ?

Il est important d'informer votre médecin que vous êtes traité par Brivact® avant de prendre un autre médicament. **Évitez l'automédication** pendant votre traitement, demandez toujours conseil à un professionnel de santé avant de prendre un médicament quel qu'il soit, en raison du risque d'interaction médicamenteuse.



## EST-IL POSSIBLE DE CONDUIRE MA VOITURE ?

**Vous ne devez pas conduire**, faire de la bicyclette ou utiliser des outils ou machines avant de savoir quels sont les effets du médicament sur vous. En effet, vous pourriez ressentir une somnolence, des sensations vertigineuses ou une fatigue pendant le traitement par Brivact®. Ces effets sont plus susceptibles de survenir en début de traitement ou après une augmentation de la dose.



## QU'EST-CE QUI POURRAIT ÊTRE UTILE AUSSI ?

**Buvez suffisamment d'eau** au cours de la journée, cela est bon pour une hydratation optimale de votre organisme. Cela permet aussi d'améliorer le fonctionnement de vos reins. **Si vous buvez de l'alcool**, les effets négatifs de l'alcool peuvent être augmentés. **Les comprimés pelliculés de Brivact® contiennent du lactose** (un type de sucre), si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament. La solution buvable contient du sorbitol et du parahydroxybenzoate de méthyle.



## ET AU NIVEAU DE LA GROSSESSE ?

Sachez que l'arrêt des traitements antiépileptiques pendant la grossesse pourrait conduire à une exacerbation de la maladie qui pourrait être délétère pour la mère et pour le fœtus. Le médecin vous donnera les indications nécessaires en cas de grossesse.