

FACTEUR DE CROISSANCE LEUCOCYTAIRE

LONQUEX® - lipegfilgrastim
Laboratoire Teva Santé

Solution injectable sous-cutanée à 6 mg
(Seringue préremplie contenant 0,6 mL de solution)

Liste I

PIH trimestrielle

100 %

Coll

ASMR V

INDICATIONS

CANCÉROLOGIE

Réduction de durée de neutropénie et d'incidence de neutropénie fébrile chez les adultes recevant une chimiothérapie cytotoxique pour une affection maligne (à l'exception de la leucémie myéloïde chronique et des syndromes myélodysplasiques).

POSOLOGIE

Une seringue préremplie (6 mg) par voie SC (abdomen, haut du bras ou de la cuisse), environ 24 h après la chimiothérapie cytotoxique. Auto-administration possible. Délai d'environ 30 min après avoir sorti la seringue du réfrigérateur pour atteindre une température confortable pour l'injection.

CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité au principe actif ou à l'un des excipients.

PRÉCAUTIONS ET SURVEILLANCE

Risque de réactions allergiques

Traitement approprié et suivi du patient pendant plusieurs jours.

Risque d'immunogénicité

Production d'anticorps dirigés contre le médicament (effets indésirables, perte d'efficacité).

Risque hématopoïétique

Surveillance régulière formule sanguine.

Risque d'hypokaliémie

Contrôle kaliémie. Apport potassique si besoin.

Risque de splénomégalie

Surveillance de la taille de la rate. Si douleur région supérieure gauche de l'abdomen ou sommet de l'épaule : le diagnostic de rupture splénique est envisagé.

Risque pulmonaire

Symptômes à surveiller : toux, fièvre, dyspnée...


Risque rénal

Surveillance urinaire recommandée.

Présence de sorbitol

MÉCANISME D'ACTION

Facteur de croissance des neutrophiles, de longue durée d'action



EFFETS INDÉSIRABLES

Effets très fréquents

Douleurs musculo-squelettiques et nausées.

Effets fréquents

Thrombopénie, hypokaliémie, céphalées, hémoptysie, réactions cutanées, douleurs thoraciques.

Effets peu fréquents

Leucocytose, splénomégalie, réactions pulmonaires (pneumopathie interstitielle), hémorragie pulmonaire, réactions au site d'injection, élévation de la phosphatase alcaline sanguine, élévation de la lactate déshydrogénase sanguine.

INTÉRACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Aucune interaction significative n'a été rapportée à ce jour.

FACTEUR DE CROISSANCE LEUCOCYTAIRE

LONQUEx® - lipegfilgrastim
Laboratoire Teva Santé

Solution injectable sous-cutanée à 6 mg
(Seringue préremplie contenant 0,6 mL de solution)



POURQUOI M'A-T-ON PRESCRIT CE MÉDICAMENT ? ET COMMENT AGIT-IL ? ?

Ce médicament vous a été prescrit pour permettre de normaliser votre taux de globules blancs appelés neutrophiles. Ce traitement permettra en particulier de limiter les risques de cette baisse des neutrophiles appelée « neutropénie », souvent associée à de la fièvre qui signe l'installation d'une infection.

Le principe actif lipegfilgrastim agit en stimulant la moelle osseuse, lieu où sont fabriqués les globules blancs qui vous permettent de vous défendre contre les infections.



COMMENT CONSERVER MON MÉDICAMENT ?

Conservez ce médicament, dans son emballage extérieur, au réfrigérateur entre 2 et 8°C. Surtout ne le congélez pas car il perdrait son efficacité.

Toutefois, vous pouvez sortir ce médicament du réfrigérateur et le conserver à une température ne dépassant pas 25°C pendant une période unique d'une durée maximale de 3 jours. Mais, une fois sorti du réfrigérateur, le médicament doit être utilisé dans le délai indiqué ou éliminé.



COMMENT DOIS-JE LE PRENDRE ?

L'injection de 6 mg, soit le contenu d'une seringue préremplie, s'effectue par voie SC, environ 24 heures après la dernière dose de chimiothérapie.

Vous pourrez réaliser l'injection vous-même si vous vous en sentez capable lorsque le médecin vous aura appris la technique d'injection.

N'oubliez pas de prendre les autres médicaments qui vous ont éventuellement été prescrits.



QUE DOIS-JE FAIRE EN CAS D'OUBLI ?

Si vous réalisez vous-même vos injections et que vous avez oublié une injection, contactez votre médecin afin de savoir quand injecter la dose suivante.



A QUELS EFFETS INDÉSIRABLES DOIS-JE M'ATTENDRE ?

Si des effets indésirables surviennent pendant votre traitement, il est important de venir en parler à la pharmacie ou de contacter votre médecin.

Les effets indésirables les plus fréquents sont les douleurs musculaires et osseuses ainsi que les nausées.

Signalez rapidement à votre médecin tout autre effet indésirable comme par exemple maux de tête, réactions cutanées, démangeaisons, douleur thoracique, toux, fièvre, douleur en haut à gauche de votre abdomen ou dans l'épaule gauche...



COMMENT DOIS-JE SURVEILLER LE TRAITEMENT ?

Un bilan sanguin vous est régulièrement demandé, pensez bien à vos rendez-vous au laboratoire d'analyses médicales.



PUIS-JE PRENDRE D'AUTRES MÉDICAMENTS ?

Evitez l'automédication pendant votre traitement, demandez toujours conseil à un professionnel de santé avant de prendre un médicament quel qu'il soit, il peut exister un risque d'interaction médicamenteuse.



QU'EST CE QUI POURRAIT ÊTRE UTILE AUSSI ?

Buvez suffisamment d'eau au cours de la journée, cela est bon pour une hydratation optimale de votre organisme et permet d'améliorer le fonctionnement de vos reins.

Evitez l'exposition prolongée au soleil.



ET AU NIVEAU DE LA SEXUALITÉ ?

Par mesure de précaution, il est préférable d'éviter l'utilisation de Lonquex® pendant la grossesse.